

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Egyben címke 100 db. illetve 4x100 db zacskót tartalmazó kartondobozra

Api Life Var impregnált csík mézelő méheknek A.U.V.

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

Engedélyes: Chemicals Laif S.P.A., Viale dell'Artigianato 13, 35010 Vigonza (PD), Olaszország

Gyártó: Chemicals Laif S.P.A. Via Roma 69, 36020 Castegnero (VI), Olaszország

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

1 db csík (11 g) tartalmaz:

Hatóanyagok:

timol: 8 g

eukaliptusz olaj: 1,72 g

(1-8 cineole>1,2 g)

kámfor: 0,39 g

L-mentol: 0,39 g

Segédanyag:

fenoplaszt

4. JAVALLATOK

A készítmény mézelő méhek varroatózisének (*Varroa destructor* által okozott parazitózisának) kezelésére alkalmas.

5. ELLENJAVALLATOK

Nem alkalmazható mézhordás idején.

Nem alkalmazható abban az esetben, ha a nappali csúcshőmérséklet meghaladja a 30°C-t.

6. MELLÉKHATÁSOK

Az alkalmazást követő néhány napon át a méhcsaládoknál esetleg enyhe izgalom, ingerültség jelentkezhet.

30°C-t meghaladó hőmérséklet esetén alkalmazva izgatottság jelentkezhet, illetve növekedhet a fiasítás és a kifejlett méhek elhullásának aránya.

Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, a használati utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost!

7. CÉLÁLLAT FAJOK

Mézelő méh (*Apis mellifera* L.)

8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Méhkaptárban való alkalmazásra.


Gyógyszeradagolás: Egy zacskó 2 db csíkot tartalmaz, egy csík egy család egyszeri kezelésére alkalmas.

A kezelés 7 – 10 naponta ismételhető, a fertőzöttség függvényében, legfeljebb 4 alkalommal. A kezelés végén, amennyiben maradt csík vagy annak darabja a kaptárban, akkor azt el kell távolítani.


Alkalmazási mód:

A zacskóból kivett csíkot törjük négy részbe, nyissuk ki a kaptárt és helyezzük be az egyes darabokat a léputcák fölé, a sarkokba, távol a kaptár középső részén lévő fiasítástól. Zárjuk vissza a kaptárt. A termék mintegy 7-10 napon keresztül kifejti hatását. (lásd az 1,2,3,4 sz. ábrát). A kezelés a fertőzöttség függvényében legfeljebb 4 alkalommal ismételhető.






1.



2.



3.



4.

5. Nyissuk ki a 2 db csikot tartalmazó csomagot.
6. Vegyük ki az egyik csikot, s törjük 3-4 felé.
7. Nyissuk ki a kaptárt, s helyezzük az egyes darabokat a képen látható módon a léputcák fölé!
8. Zárjuk vissza a kaptárt. A kezelés 7-10 naponta ismételhető, a fertőzöttség függvényében, legfeljebb 4 alkalommal. Az esetleges maradványanyagokat a kezelés végén távolítsuk el!

A kezeléseket mézpergetés után, illetve a fiókok elvételét követően végezzük!

9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

A készítmény hatékonysága méhcsaládonként a környezeti tényezők hatására (hőmérséklet, újrafertőződés) változó lehet. Az Api Life Var készítményt a varroa atka elleni integrált védekezés részeként ajánlott alkalmazni, a lehullott atkák számának folyamatos ellenőrzésével. Amennyiben az atkafertőzöttség növekedése tapasztalható, ajánlott egyéb kiegészítő kezelést alkalmazni a téli-tavaszi varroa atka elleni kezeléskor.

10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Méz: nulla nap.

Mézhordás ideje alatt nem alkalmazható.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

A kereskedelmi csomagolású állatgyógyászati készítmény felhasználható: 2 évig.

Felbontás után azonnal felhasználandó!

15-25°C között, az eredeti csomagolásban, közvetlen napfénytől védve tárolandó.

Fagyástól óvni kell.

Az esetleges szennyeződés elkerülése végett a készítmény növényvédő szerektől és egyéb vegyi anyagoktól távol tartandó.

Élelmiszerektől távol tartandó.



Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK

Különleges figyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan

30°C-t meghaladó hőmérséklet esetén alkalmazva izgatottság jelentkezhet, illetve növekedhet a fiasítás és a kifejlett méhek elhullásának aránya.

A készítmény hatékonysága növelhető, ha késő nyáron, a mézhordás után (a petezés intenzitásának csökkenésekor) alkalmazzuk.

A készítménnyel való, megfelelő hatékonyságú kezelés 20-25°C közötti külső hőmérsékleten érhető el. Amennyiben a külső hőmérséklet 15°C alá csökken, gyengülhet a készítmény hatékonysága.

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések

Mézőgyűjtési időszakban ne alkalmazzuk a készítményt!

A készítmény alkalmazása előtt ne etessük a méhcsaládokat!

A rablás elkerülése érdekében egy méhészetben az összes kaptárt egyszerre kezeljük.

Ügyeljünk rá, hogy az impregnált csíkot ne a fiasítás közelébe, ne a kaptár középső részébe helyezzük.

Kezelés előtt a gyenge méhcsaládokat egyesíteni szükséges.

Méztéri fiókok nélkül végezzük a kezeléseket!

Soha se helyezzük a csíkokat cukorszirup etető közelébe, mivel csökkentheti a méhek étvágyát!

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések

A timol bőr irritatív tulajdonsága miatt az állatgyógyászati készítmény alkalmazása során az alábbi egyéni védőfelszerelés viselése kötelező: védőruházat, védőszemüveg, védőkesztyű. A készítmény alkalmazása során kerülni kell annak bőrre vagy szembe kerülését. Ha a készítmény mégis bőrre kerül, az érintett területet azonnal mossuk le bő szappanos vízzel. Véletlen szembe kerülés esetén a szemet bő vízzel, azonnal ki kell mosni. Tartós irritáció esetén orvoshoz kell fordulni. Véletlen belélegzés vagy lenyelés esetén az orrot, a száját és a torkot vízzel ki kell öblíteni. Ha a tünetek nem múlnak, orvoshoz kell fordulni. Alkalmazás után a készítménnyel érintkezésbe kerülő eszközöket meg kell tisztítani, valamint alaposan kezdet kell mosni. A készítmény használata közben enni, inni, dohányozni tilos.

Túladagolás

Az előírt dózisonál nagyobb mennyiség alkalmazása esetén viselkedési zavarok (nyugtalanság, kaptárelhagyás, megnövekedett mortalitás) jelentkezhet. Túladagolás esetén távolítsuk el a terméket a kaptárból.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

14. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA

2013. január 8.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Törzskönyvi szám:

3218/1/12 NÉBIH ÁTI (11 g csík)

Kiszereles:

2 db impregnált csíkot tartalmazó laminált zacskó.

100 zacskó kartondobozban. Bontható. Használati utasítások mellékelve.

4 x 100 zacskó kartondobozban. Bontható. Használati utasítások mellékelve.

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.

Vény nélkül, szabadon forgalmazható.

Gy.sz.: lsd a csomagolás hátoldalán

Lejáratí idő: lsd a csomagolás hátoldalán

