

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

API -Bioxal atkaölő por mézelő méhek számára A.U.V.

### 1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Erista Kft. (9028 Győr, József A. u. 5/A)

A gyártási tételek felszabadításért felelős gyártó:

Chemifarma SPA (Via Don Eugenio Servadei, 16-47100 Forlì (FC), Olaszország)

### 2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

API -Bioxal atkaölő por mézelő méhek számára A.U.V.

### 3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

100 g készítmény tartalmaz:

Hatóanyagok:

Oxálsav-dihidrát 88,6 g

Segédanyagok:

Szilícium-dioxid, koloid, víztartalmú

Glükóz-monohidrát

### 4. JAVALLAT(OK)

Mézelő méh *Varroa destructor* okozta fertőzésének kezelésére.

### 5. ELLENJAVALLATOK

Az API-Bioxal hatékonyságát a fiasítás jelenléte jelentősen csökkenti, ezért a készítmény alkalmazása ebben az időszakban nem javallott.

### 6. MELLÉKHATÁSOK

A családokat kis mértékben megzavarhatja a kezelés

### 7. CÉLÁLLAT FAJOK

Mézelő méh (*Apis mellifera*)

### 8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Méhkaptárban való alkalmazásra

Adagolás csurgatással történő alkalmazás esetén:

A készítmény oldjuk fel 1:1 arányú (1 rész víz:1 rész cukor) cukorszirup oldatban

35 g-os API-Bioxal-t 500 ml szirupban,

175 g-os API -Bioxal-t 2,5 l szirupban,

350 g-os API -Bioxal-t 5 l szirupban.

Egyszeri kezelést végezzünk, melynek során 5 ml oldatot csepegtessünk be a méhekkal takart léputcák közé egy adagoló fecskendő segítségével.

Adagolás porlasztás útján történő alkalmazás esetén:

Töltsük fel a porlasztó készüléket 2,3 g API-Bioxal-lal, melyet helyezünk a kaptárbejáraton keresztül a méhek alá. Zárjuk le a kijáratot, hogy sem a méhek, sem pedig a porlasztással létrejött „köd” ne tudjon eltávozni. A gyártó használati utasítását követve mintegy 3 percen keresztül működtessük a készüléket (mintegy 280-290 °C-os végső hőmérsékleten). Tartsuk zárva a kaptárat 10 percen át.

### 9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

Integrált kártevő (atkamentesítési) program

A hatékonyság családonként változhat, az alkalmazás feltételeinek függvényében (fiasítás jelenléte, hőmérséklet, visszafertőződés stb.). Ennek megfelelően a termék használata más termékek mellett ajánlott, egy integrált atkamentesítési program keretén belül, az atkaszám rendszeres ellenőrzése mellett.

### 10. ÉLELMÉZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Méz: nulla nap.

## 11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Az eredeti csomagolásban, közvetlen napfénytől védve tárolandó. Hűtőben nem tárolható. Fagyástól óvni kell.

A kereskedelmi csomagolású állatgyógyászati készítmény felhasználható: 2 évig.

A közvetlen csomagolás első felbontása után felhasználható: 3 hónapig.

Az előírás szerinti feloldás után felhasználható: 24 órán át.

## 12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

**Különleges figyelmeztetések az egyes célállat fajokra vonatkozóan**

Mézterek nélkül végezzük a kezelést!

A méhészet valamennyi családját egyidőben kezeljük, a visszafertőzés elkerülése érdekében!

A kezelést követő napokban ne háborgassuk a családokat!

### **A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések**

A jobb hatékonyság elérése érdekében a tél kezdetekor, fiasításmentes, vagy csak kevés fiasítást tartalmazó kaptáraknál használjuk a terméket, illetve olyan nyári időszakban, amikor emberi beavatkozás eredményeként fiasítás mentes állapot alakul ki. Előírás szerinti kezelés ellenére is előfordulhat, hogy a családok nem élik túl a súlyos, kritikus fertőzöttséget.

### **Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések**

Kerüljük a készítmény bőrre kerülését és belélegzését. Az állatgyógyászati készítmény előkészítése, alkalmazása során az alábbi egyéni védőfelszerelés viselése kötelező: FFP2 típusú védőálarc, saválló kesztyű és védőszemüveg.

A kezelést követően kezet kell mosni. Minden olyan tárgy/eszköz, amely kapcsolatba került a szerrel, szappanos vízzel lemosandó.

Amennyiben a készítmény szembe kerül haladéktalanul orvoshoz kell fordulni bemutatva a készítmény használati utasítását vagy címkéjét.

### **Gyógyszerkölsönhatások**

Ne alkalmazzuk egyidejűleg egyéb varroa elleni gyógyszerrel.

### **Túladagolás**

Túladagolás vagy többszöri kezelés a családok gyengüléséhez vagy elvesztéséhez vezethet, illetve a tavaszi fejlődés jelentősen visszaeshet.

### **Inkompatibilitások**

Nem keverhető más állatgyógyászati készítménnyel.

## 13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

A készítmény nem kerülhet természetes vizekbe, mert veszélyes lehet a halakra és más vízi élőlényekre.

## 14. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA

2012. július 23.

## 15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselőjéhez.

### 15.1. Rendelhetőség

Csak állatorvosi rendelvényre kiadható állatgyógyászati készítmény. Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.

### 15.2 Forgalmazhatóság

Állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

### 15.3. Kiszerezési egységek

35 g, 175 g és 350 g, többretegű műanyag/alumínium tasakban, hegesztéssel lezárva.

### 15.4. Törzskönyvi szám

3186/1/12 NÉBIH ÁTI (35 g)

3186/2/12 NÉBIH ÁTI (175 g)

3186/3/12 NÉBIH ÁTI (350 g)

