

APIFEED

Virágporpótló takarmány méhek számára

Az APIFEED fehérje, vitamin, ásványi anyag, és aminosav tartalma minden szempontból megfelel a méhek tápanyagigényének. Etetése segíti a méhcsalád növekedését, erősödését, fokozza ellenálló képességüket a betegségekkel szemben és növeli a mézhozamot.

Összetevők: Szárított élesztők, Kluyveromyces fragilis, Saccharomyces cerevisiae - Szacharóz - Gabona származékok - Hüvelyes növényi származékok - Olajos magvak származékai - Ásványi anyagok

Átlagos tápanyagtartalom 1 kg-ban

vitaminok:

E 300 Aszkorbin sav (Vitamin C) 5000 mg, Nikotinamid 2500 mg, Kalcium D-pantotenát 500 mg, B- vitamin komplex

Technológiai segédanyagok: antioxidánsok, tartósító szerek

E 330 Citrom sav - E 321 BHT 10 mg, Aroma keverék 1000 mg

Beltartalmi értékek:

Nyers fehérje 29,23% - Nyers rost 2,20% - Nyers zsírok 2,60% - Nyers hamu 7,62% - Nártium 2,54% - Lizin 1,59% - Metionin 0,39%

Felhasználhatóság és adagolás:

Az APIFEED virágpor pótló felhasználható egész éven keresztül, a családok szükségleteinek megfelelően. (0,4 kg - 0,5 kg / kaptár / év). Különösen ajánlott kora tavasszal (február végétől), virágporszegény időszakokban, késő nyáron és ősszel. Ne használjuk hordási időszak alatt! Felhasználása cukorlepenyhez keverve, szárazon, vagy sziruphoz keverve egyaránt lehetséges.

Adagolás:

- Keverjük 50 g Apifeed-et 1kg cukorlepenyhez.

- Keverjük össze 30-50 g Apifeed-et ugyanannyi porcukorral és közvetlenül helyezzük a kijárók elé. - Adjunk 50 g Apifeed-et 1L cukorsziruphoz (javasoljuk, hogy az Apifeed-et keverje el egy kevés vízben mielőtt a cukorsziruphoz adja).

Figyelmeztetés: A méheknek adott takarmány egy részét a méhek a fészekben tárolhatják, majd elfogyasszák vagy a méztérbe áthordhatják! Az élelempótlás célja hogy a méhek azt közvetlenül elfogyasszák hordás szegény időszakokban. A virágporpótló megjelenése, vagy nyomainak kimutathatósága a mézben abban az esetben fordulhat elő amikor az etetéssel egy időben fiasítás a leginkább kiterjedt és a fias legközelebb kerül a méztérhez, jellemzően a tavasz során. A virágporpótló kis mennyiségű megjelenése a mézben nem befolyásolja annak minőségét, de törekedjünk ennek megelőzésére. Minden fajta virágporpótlót úgy kell adagolni, hogy a méhek fogyasztási igényének megfelelő legyen, és megelőzzük annak felhalmozódását a kaptárakban. Ebből adódóan a mézhordás megindulás előtt pár héttel abba kell hagyni a termék használatát.