

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Egyben doboz címke (10 db, 50 g gélt tartalmazó tálcá), ill. 1 kg-os és 3 kg-os műanyag tartálynak
Apiguard gél mézelő méheknek A.U.V.

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Vita (Europe) Limited, 21/23 Wote Street, Baringstoke, Hampshire RG 21 7 NE, UK

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó: Laleham Healthcare Ltd, Newman Lane, Alton, Hampshire, GU34 2QR, UK

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

50 g gél tartalmaz:

Hatóanyag:


Timol: 12,5 g (25%)

Segédanyagok:

Poliakril sav

Trietanolamin

Tisztított víz



4. JAVALLATOK

A készítmény mézelő méhek varroa atka (*Varroa destructor*) okozta varroatózisának kezelésére alkalmas.

5. ELLENJAVALLATOK

6. MELLÉKHATÁSOK

Az alkalmazást követő néhány napon át a méhcsaládoknál esetleg enyhe izgalom, ingerültség jelentkezhet.

Amennyiben a kezelés során a külső hőmérséklet meghaladja a 33°C-ot, a fiatal fiasítás csökkenése jelentkezhet. A jelenség átmeneti, összességében a méhcsalád fejlődését nem befolyásolja.

Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, a használati utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost!

7. CÉLÁLLAT FAJOK

8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Méhkaptárban való alkalmazásra.

Gyógyszeradagolás: családonként 50 g gél kétszeri alkalmazása javasolt, kéthetes időközzel. Évente legfeljebb két kezelés javasolt

Alkalmazási mód: Nyissuk ki a kaptárt. Tépjük le a tálcá fóliáját úgy, hogy egyik sarka maradjon a tálcához rögzítve. Helyezzük a nyitott tálcát a keretek tetejére, középre, a géllal felfelé. Győződjünk meg róla, hogy a tálcá teteje és a kaptártető között maradt legalább 0,5 cm üres tér. Zárjuk le a kaptárt. 2 hét után helyezzünk egy másik tálcát a régi helyére a fentiek szerint. A tálcát mindaddig hagyjuk a kaptárban, míg ki nem ürül. A mézkamra behelyezésekor távolítsuk el a készítményt a kaptárból.

Kicsi vagy telelő családok esetében egy tálcá Apiguard gél alkalmazása is elegendő lehet, melyet 4 héten át kell a kaptárban hagyni.

A készítmény hatékonysága növelhető, ha késő nyáron, a mézhordás után (a petezés intenzitásának csökkenésekor) alkalmazzuk. Erős fertőzőtség esetén a készítmény tavasszal is alkalmazható, amennyiben a külső hőmérséklet a 15°C-ot meghaladja.

9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

A hatékonyság méhcsaládonként változó lehet. Az Apiguard gél készítményt a varroa atka elleni integrált védekezés részeként ajánlott alkalmazni, a lehullott atkák számának folyamatos ellenőrzésével. Amennyiben az atkafertőzöttség növekedése tapasztalható, ajánlott egyéb kiegészítő kezelést alkalmazni a téli-tavaszi varroa atka elleni kezeléskor.

10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Élelm.ü.v.idő:

Méz: nulla nap.

Mézhordás ideje alatt nem alkalmazható.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

A kereskedelmi csomagolású állatgyógyászati készítmény felhasználható: 18 hónapig

Felbontás után azonnal felhasználandó!

Legfeljebb 30°C-on, az eredeti csomagolásban, közvetlen napfénytől védve tárolandó.

Fagyástól óvni kell.

Az esetleges szennyeződés elkerülése végett a készítmény növényvédő szerektől és egyéb vegyi anyagoktól távol tartandó.

Élelmiszerektől távol tartandó.

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések

A készítmény alkalmazása előtt ne etessük a méhcsaládokat!

Ne használjuk a készítményt, ha a napi hőmérséklet 15°C-nál alacsonyabb, 40°C-nál magasabb, illetve ha a méhcsaládok aktivitása nagyon alacsony.

Kezelés előtt a gyenge méhcsaládokat egyesíteni szükséges.

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések

A timol bőr irritatív tulajdonsága miatt az állatgyógyászati készítmény alkalmazása során az alábbi egyéni védőfelszerelés viselése kötelező: védőruházat, védőszemüveg, gumikesztyű. A készítmény alkalmazása során kerülni kell annak bőrre vagy szembe kerülését. Ha a készítmény mégis bőrre kerül, az érintett területet azonnal mossuk le bő szappanos vízzel. Véletlen szembe kerülés esetén a szemet bő vízzel azonnal ki kell mosni. Tartós irritáció esetén orvoshoz kell fordulni. Véletlen belélegzés vagy lenyelés esetén az orrot, a száját és a torkot vízzel ki kell öblíteni. Ha a tünetek nem múlnak, orvoshoz kell fordulni. Alkalmazás után a készítménnyel érintkezésbe kerülő eszközöket meg kell tisztítani, valamint alaposan kezét kell mosni. A készítmény használata közben enni, inni, dohányozni tilos.

Túladagolás

Az előírt dózissnál (50 g gél azaz 12,5 g timol / méhcsalád) nagyobb mennyiség alkalmazása esetén viselkedési zavarok (nyugalanság, kaptárelhagyás, megnövekedett mortalitás) jelentkezhet. Túladagolás esetén távolítsuk el a terméket a kaptárból.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

14. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Törzskönyvi számok:

3214/1/12 NÉBIH ÁTI (50 g)

3214/2/12 NÉBIH ÁTI (1 kg)

3214/3/12 NÉBIH ÁTI (3 kg)



Kiszerezés:

10x50 g

1 kg

3 kg

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.

Vény nélkül, az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Gy.sz.:

Lejáratí idő:

