

TERMÉKISMERTETŐ

És címke 100 ml, 500 ml, 2000 ml-es flakonra



1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

HiveAlive

Állatgyógyászati gyógyhatású készítmény

2. TERMÉKFORMA

Belsőleges oldat

3. A KÉSZÍTMÉNY ÖSSZETÉTELE

Tengeri bio-kivonatok, timol, citromfűolaj

4. CÉLÁLLAT FAJOK

Mézelő méh (*Apis mellifera*)

5. A KÉSZÍTMÉNY FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE, FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT, JAVALLATOK

A HiveAlive jelentős segítséget nyújt a Nosema-fertőzöttség és a varroózis elleni küzdelemben. Rendszeres használata elősegíti az erős, egészséges méhcsaládok és a kiegyensúlyozott méztermelés fenntartását.

Segít a bélrendszer egészségének fenntartásában. Megnöveli a fiasítási és hordási hajlamot. Erősíti a méheket. Teljesen természetes hatóanyagokat tartalmaz. Használata könnyű és egyszerű.

6. ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS MÓDJA

Szirupkészítés: 1. Használat előtt alaposan rázza fel a HiveAlive-ot.

2. Etetéshez javasoljuk, hogy keverjen 2,5 ml HiveAlive-ot minden liter cukorsziruphoz. Minimum 4 liter bekevert cukorszirup használata ajánlott családonként. A cukorszirup hőmérséklete nem haladhatja meg az 50°C-ot.

3. Alaposan keverje el.

4. Egy kezelési ciklus alatt, melynek optimális időtartama 2-4 hét, jutassa be ezt a szirup/hatóanyag mennyiséget a kaptárba a kívánt módon.

100 ml 10 család teljes kezelésére elegendő.

Etetési tanácsok: A HiveAlive-ot nyár végén tanácsos etetni a méz elvétele után, ill. tavasszal, a hordás megkezdése előtt, az alábbi módokon:

Nosema-fertőzöttség kiegészítő kezelésére:

Nyár végén, ill. a méz elvétele után: itatóból az alkalmazott itatási technológiának megfelelően, pl.: 1 literes itatóból 2,5 ml HiveAlive/1l cukorszirup etetése legalább 4 alkalommal. Kisebb itató esetén több alkalomra osszuk el arányosan az előírt szirup/hatóanyag mennyiséget. Ebben az időszakban a csurgatás/locsolás is ajánlott az itatás mellett. A két kezelési mód igény szerint kombinálható az előírt hatóanyag össz mennyiség bejuttatásának figyelembe tartásával.

Tavasszal, kaptárbontás után a csurgatásos etetési mód ajánlott, melyet a hordás megkezdése előtt két héttel be kell fejezni.

Csurgatás/locsolás: három héten keresztül hetente egyszer 1:100 arányú HiveAlive-val kezelt cukorsziruppal (pl.: 2 ml HiveAlive/200 ml cukorszirup) úgy, hogy a méhek testfelülete és a keretek mindkét oldala egyenletesen átitatódjon. Az előírt HiveAlive mennyiségből a csurgatás mellett fennmaradó részt a fent leírt módon etessük fel.

Varroa destructor fertőzöttség kiegészítő kezelésére a csurgatás/locsolás ajánlott (lásd az előző szakaszt).

7-8. ELLENJAVALLATOK, MELLÉKHATÁSOK

Nincsenek.

9. FIGYELMEZTETÉSEK

Mézhordási időben nem alkalmazható.

Használatkor viseljen megfelelő (méhészeti) védőruházatot: kesztyűt és szem/arcvédőt! Szembe, vagy bőrre ne kerüljön! Ha szembe kerül, bő vízzel mossa ki legalább 15 percen keresztül! Ha bőrre kerül, bő vízzel, szappannal mossa le! Nagyobb mennyiség lenyelése esetén igyon sok vizet, és forduljon orvoshoz!

10. LEJÁRATI IDŐ

Felhasználható: 30 hónapig.

Az esetleges elszíneződés a minőséget nem befolyásolja.

11. TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

8-20°C között, napfénytől védett helyen tartandó.

12. CSOMAGOLÁS

100 ml, 500 ml, 2000 ml-es műanyag flakonban

13. GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ!

14. KIZÁRÓLAG ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI VAGY ÁLLATÁPOLÁSI CÉLRA!

15. A FEL NEM HASZNÁLT ANYAG ÉS A HULLADÉK KEZELÉSÉNEK MÓDJA

A fel nem használt készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

16. A GYÁRTÓ ÉS A FORGALMAZÓ NEVE ÉS CÍME

A termék forgalmazója: Vernalis Bt., 7694 Hosszúhetény, Püspökszentlászló u. 11.

Tel.: +36 30 743-7048

www.vernalis.hu

Gyártó: ADVANCE SCIENCE, Írország (www.advancescience.com)

17. NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

488/1/2012 NÉBIH ÁTI (100 ml)

488/2/2012 NÉBIH ÁTI (500 ml)

488/3/2012 NÉBIH ÁTI (2000 ml)

Gyártási szám: lásd a csomagoláson

Minőségét megőrzi: lásd a csomagoláson

