

## TERMÉKISMERTETŐ

**Egyben címke:** Az 1-es számú flakont (80 ml oldattal) és a 2-es számú flakont (20 ml oldattal) tartalmazó kartondoboznak.

### NOSESTAT<sup>®</sup> oldat

Állatgyógyászati gyógyhatású készítmény méhek kezelésére.

#### A készítmény összetétele:

- Az 1-es számú flakon tartalma:  
jód (4 g) vivő- és segédanyagok (ad 80 ml).
- A 2-es számú flakon tartalma:  
hangyasav (5 g) vivő- és segédanyagok (ad 20 ml).

#### Célállatfaj:

mézelő méh (*Apis mellifera* L.)

#### A készítmény felhasználási területének rövid leírása, felhasználási javaslat, javallatok:

A NOSESTAT<sup>®</sup> oldat a *Nosema apis* és *Nosema ceranae* által okozott nosemosis kiegészítő kezelésére ajánlott. Hatását a benne található jód és hangyasav kedvező tulajdonságának köszönheti. A termék hangyasavtartalma segít a varroa atkák (*Varroa destructor*) által okozott varroatózis kiegészítő kezelésében is. A termék stabilizáló és ízesítő anyagokat is tartalmaz, így a méhek szívesen fogyasztják. A NOSESTAT<sup>®</sup> oldat felhasználható cukorlepenyvel vagy cukorsziruppal feletetve, melyben jól oldódik.

Ajánlott kezelési időszak: ősszel és tavasszal.

#### Az adagolás és az alkalmazás módja:

Belsőleg, 1:1 arányú (50%-os) cukorsziruppal vagy cukorlepenyvel feletetve.

A flakonok tartalmát jól fel kell rázni, majd a 2-es számú flakon tartalmát az 1-es számú flakonba kell önteni. Az így kapott oldatot össze kell keverni.

1 liter cukorsziruphoz vagy 1 kg cukorlepenyhez a fenti keverékből 5 ml-t adjunk.

Az elkészített és cukorlepenybe vagy cukorszirupba kevert oldat 3 napig használható fel.

Cukorsziruppal történő kezelés:

A sziruppal három alkalommal kell kezelni a méheket, az egyes kezeléseket között három nap szünetet tartva (azaz az 1., a 4. és a 7. napon). Kezelésenként 500-800 ml-t kell feletetni. Egy hét szünet után meg kell ismételni a kezelést az előbbieket szerint.

Cukorlepenyvel történő kezelés:

A cukorlepenyvel történő kezelésnél 200-300 g-ot adjunk a méhcsaládnak. Miután a méhek elfogyasztották a NOSESTAT<sup>®</sup> oldatos cukorlepenyvet, még egy alkalommal ismételjük meg a kezelést.

A készítmény keveréktakarmány előállítására nem használható fel!

A túladagolás elkerülése érdekében a NOSESTAT<sup>®</sup> oldat cukorsziruphoz vagy cukorlepenyhez történő adagolásához használja a mellékelt fecskendőt.

#### Ellenjavallatok:

Ne alkalmazzuk együtt más kezelésre vagy megelőzésre szolgáló készítményekkel.

A NOSESTAT<sup>®</sup> oldat használatát legkésőbb a mézhordás megkezdését megelőző 7. napon be kell fejezni.


#### Mellékhatások:

Mellékhatásokat nem figyeltek meg.

**Figyelmeztetések:**

A NOSESTAT<sup>®</sup> oldattal végzett munka során ajánlott polietilén vagy latex védőkesztyű, valamint védőoverall használata, megelőzendő a bőr irritációját és elszíneződését, valamint a ruházat elszíneződését.

A NOSESTAT<sup>®</sup> oldat használata nem helyettesíti a varroatózis elleni célzott kezelést.

**Veszélyesanyag-tartalom az 1-es flakonban: jó****FIGYELEM**

A veszélyes keverékek veszélyeire/kockázataira utaló **H-mondatok**:

- Bőrrel érintkezve ártalmas.
- Belélegezve ártalmas.
- Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

A veszélyes keverékek biztonságos használatára utaló **P-mondatok**:

- Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
- Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
- Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
- HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
- BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
- A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi rendelkezéseknek megfelelően.

**Veszélyesanyag-tartalom a 2-es flakonban: hangyasav****VESZÉLY**

A veszélyes keverékek veszélyeire/kockázataira utaló **H-mondatok**:

- Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

A veszélyes keverékek biztonságos használatára utaló **P-mondatok**:

- Gyermekektől elzárva tartandó.
- BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
- SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

- LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
- HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
- A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi rendelkezéseknek megfelelően.

**Lejárat i idő:**

Felhasználható eredeti csomagolásban tárolva a gyártástól számított 2 évig.  
Az előírt feloldás utáni lejárat i idő 20 nap.

**Tárolási előírások:**

A készítmény eredeti csomagolásban, száraz, jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől védve, 5–30 °C között tárolandó.

**Csomagolás:**

A kartondoboz tartalma:

Az 1. számú tartály: 80 ml oldatot tartalmazó üveg, vagy PE flakon.

A 2. számú tartály: 20 ml oldatot tartalmazó PE flakon.

Egyszer használatos fecskendő, hosszabbítóval mellékelve.

**Kizárólag állategészségügyi célra!****A fel nem használt anyag és a hulladék kezelésének módja:**

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi rendelkezéseknek megfelelően.

**Gyártó:**

Primavet-Sofia Ltd, 211A, Slivnitsa blvd. 1202 Szófia, Bulgária

**Forgalmazó:**

EURO-VET Zöldsziget Kft. 7500 Nagyatád, Petőfi Sándor u. 24. Tel.: 06-82/454-413;

Fax: 06-82/553-180; [zoldsziget.euro-vet.hu](mailto:zoldsziget.euro-vet.hu); [zoldsziget@euro-vet.hu](mailto:zoldsziget@euro-vet.hu)

**A készítmény nyilvántartási száma:**

472/1/2012 NÉBIH ÁTI

**Lejárat i idő:****Gyártási szám:**