

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Varidol 125 mg/ml oldat mézelő méhek részére A.U.V.

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓNAK A NEVE ÉS CÍME

Az eseti forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Erista Kft., 9028 Győr, József Attila u. 5/a.

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó:

Vyzkumny ústav vcelarsky s.r.o. (Méhészeti Kutatóintézet)

Máslovice – Dol 94

252 66 Libcice n. Vlt.

Cseh Köztársaság

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Varidol 125 mg/ml oldat mézelő méhek részére A.U.V.

Amitráz

3. A HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

1 ml világosbarna oldat tartalmaz:

Hatóanyag:

Amitráz 125mg

Segédanyagok:

4. JAVALLATOK

Méhek varroózisa: a méhcsaládok kezelése Varroa destructor atka okozta fertőző betegség vagy annak gyanúja esetén, amikor a család nem, vagy csak kis területen rendelkezik fedett fiasítással. Varroa-fertőző betegség diagnosztikájára és kezelésére az október 1-től április 15-ig terjedő időszakban.

5. ELLENJAVALLATOK

Nem alkalmazható az április 16-tól szeptember 30-ig terjedő időszakban, mikor a méhcsaládoknál már nagy mennyiségben található fedett fiasítás és emberi fogyasztásra kerülő méz.

6. MELLÉKHATÁSOK

Mellékhatásként ritka esetben egyes méhcsaládoknál előfordulhat, hogy zárt repnyílásnál hangos zúgással kísért erős izgatottság lép fel. Ez a méhcsalád egyedi válaszüteme. Ilyen esetben azonnal ki kell nyitni a kaptár repnyílását.

A mellékhatások gyakoriságát az alábbi útmutatás szerint kell meghatározni:

- nagyon gyakori (10 kezelt állatból több mint 1-nél jelentkezik)
- gyakori (100 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik)
- nem gyakori (1000 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik)
- ritka (10000 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik)
- nagyon ritka (10000 kezelt állatból kevesebb mint 1-nél jelentkezik, beleértve az izolált eseteket is).

Ha bármilyen mellékhatást észlel - még ha nem is szerepel ebben a használati utasításban -, vagy úgy gondolja, hogy a készítmény nem hatott, értesítse erről a kezelő állatorvost!

7. CÉLÁLLAT FAJ

Mézelő méh

8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁS MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

A készítmény érintkezés útján fejti ki a hatását. Az amitráz hatóanyagot a kaptárban az izzó füstölőcsíkból felszabaduló füst vagy a hígított készítményből porlasztókészülékkel előállított aeroszol juttatja el a méhekhez. A hatóanyag a kifejlett méheken levő atkákat öli el. A készítmény nem jut be a fedett fiasításba. A méhek számára az érintkezés és a belélegzés megfelelően veszélytelen.

Füsttel történő alkalmazás

A füsttel történő applikációt akkor kell végezni, amikor a külső hőmérséklet meghaladja a + 10 °C-ot és a méhek nem repülnek – október 1. és április 15. között. A készítmény alkalmazása előtt a kereteket úgy kell elrendezni a kaptárban, hogy egy kb. 4 cm rés legyen a kaptár fala és a szélső keret között. A megfelelő mennyiségű készítményt a füstölőcsíkra kell cseppenteni, amely állatorvosi segédeszközként használatos. A csíkot a fészekfiók felső részén kell elhelyezni egy normál kaptár esetén. A kijárót, repnyílást zárni kell. A készítményhez mellékelt papírcsík egyik végétől számított 1 cm-re kell egy lyukat vágni. A Varidol cseppeket közvetlenül a felhasználás előtt, 3 cm magasságból, a csík felső felére kell cseppenteni (az előzetesen készített lyuk közelébe). Egy méhcsalád számára az egy csíkra cseppentett két csepp Varidol (6,2 mg aktív hatóanyag) a kezeléshez szükséges adag (egy fióknál). Amennyiben a család két fiókot foglal el, maximum 4 cseppet kell a csíkra felvinni. Nagyon gyenge családhoz egy csepp elegendő. Amint a készítmény átitatta a csíkot, azt az alsó részén meg kell gyújtani. Nem szabad, hogy lángoljon, csak parázzsal égjen! Ha fellángol, azonnal el kell fűjni! Az izzó-füstölő csíkot függőleges helyzetben kell rögzíteni egy kis viaszba nyomott szöggel úgy, hogy a csík és a szélső keret, valamint a csík és az oldalfal távolsága is 2 – 2 cm legyen. A kaptár tetejét azonnal le kell zárni! 30 perccel a behelyezés után a kaptár repnyílását ki kell nyitni. A méhcsaládokat előzetesen ellenőrizni kell, amikor a repnyílás még zárt! Diagnosztikai céllal történő használat esetén a kaptár aljába az aljdeszkára be kell helyezni egy lapot. Ezt 12 -24 órával a kezelés után el kell távolítani a kaptárból és megvizsgálni a lehullott anyagot. A kezelés után egy órával a csíkot tartó szöveget ki kell venni és ellenőrizni, hogy a csík végig elégett-e. Amennyiben elaludt a parázs, a kezelést meg kell ismételni!

Aeroszolos alkalmazás

Az aeroszolos technika alacsony külső hőmérséklet esetén előnyös, mivel a mikroszkopikus részek jobban behatolnak a téli fűrtbe, mint a füst. Egy közepesen erős méhcsalád kezelésére 3 ml 1,64%-os vizes vagy acetonos emulzió elegendő (6,2 mg aktív hatóanyag). A kezelésre szolgáló ködöt a regisztrált állatorvosi berendezéssel (VAT-1a ködölő, gyártó: Méhészeti Kutatóintézet Dol - Bee Research Institute) kell előállítani. A külső hőmérséklet alapján kell dönteni a víz vagy aceton használata mellett (lásd a táblázatot). Az aeroszolt a kijáró nyíláson át vagy a kaptár aljdeszka feletti terébe kell bejuttatni a készülékkel.

A vizes oldat elkészítése:

5 ml Varidol-t (egy fiola tartalma) kell adni 300 ml ivóvízhez

Az acetonos oldat készítése:

5 ml Varidol-t (egy fiola tartalma) kell adni 300 ml acetonhoz /csak „tisztá” acetont használata engedélyezett/

Adagolás:

Az adagolást a kezelés hossza alapján kell meghatározni, vagyis azon idő alapján, ameddig az aeroszolt a kijárón keresztül be kell irányítani a kaptárba.

Aeroszol típusa	Külső hőmérséklet	Kezelés hossza
Vizes oldat	+ 10 °C felett	120 másodperc
Acetonos oldat	-5 °Ctól +10 °C -ig	30 másodperc

Fenti értékek közepes erősségű családokra vonatkoznak, ahol 6 – 10 db 39 x 24 cm fedett keret van, valamint 1,5 ml / perc átlagteljesítményű generátorra.

Különösen erős család kezelése esetén, pl. a két fiókon levőknél, a kezelés idejét a következők szerint kell megnövelni:

- vizes oldatnál 10 – 15 °C külső hőmérsékletnél: 45 másodperccel
- vizes oldatnál 15 °C feletti hőmérsékletnél: 30 másodperccel
- acetonos oldatnál: 10 másodperccel

Ezzel ellentétben a különösen gyenge családoknál a táblázatban szereplő kezelési időt arányosan csökkenteni kell.

Az átlagos 1,5 ml/ perc teljesítményűnél kisebb aeroszol készülék használata esetén a kezelés hosszát arányosan növelni kell, mint ahogy az a különösen erős méhcsaládok esetén meghatározásra került.

A VAT-1a készülék fúvókáját megfelelő módon rögzíteni kell a kijáróba – egy nedves ruha a legjobb erre a célra. A kezelés végeztével a kaptárkijárót 30 percre zárva kell tartani.

A kezelést nappal kell elvégezni, mikor a külső hőmérséklet a -5 °C-ot meghaladja és a méhek sem röpködnek, október 1 és április 15 közötti időszakban.

9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

Cseppentésnél a fiolát fejjel lefelé kell fordítani minden egyes csepphez, függőlegesen tartani és megvárni, míg a csepp magától aláhull. A fiola kézzel való felmelegítése segíti a cseppenést. A meggyújtásra váró papírcsík alá egy 15 x 15 cm-es fém vagy alumínium lemezt kell elhelyezni. Kezelést követően egy órán keresztül ellenőrizni kell a kaptárokat az esetleges tűz megelőzése miatt.

10. ÉLELMEZÉS EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Méz: Nulla nap

Az állatgyógyászati készítmény csak mézgyűjtési időszakon kívül alkalmazható.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Legfeljebb 25 °C-on tárolandó. Fagyástól óvni kell. Közvetlen napfénytől védve tartandó. Ezt az állatgyógyászati készítményt csak a dobozon feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni! A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések: Míg a kijáró zárva van, ellenőrizni kell a családot és erős izgatottság esetén ki kell nyitni a repnyílást.

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések: Kerülni kell a készítmény szájba, szembe vagy bőrre kerülését, belélegzését! Alkalmazás során megfelelő védőruházatot, védőszemüveget, gázmaszkot megfelelő típusú szűrővel és gumikesztyűt kell viselni! Aeroszol alkalmazása zárt térben tilos és külső térben a kezelés 5 m-es körzetében maszk viselése kötelező! Acetonos kezelés esetén mindenféle nyílt láng használata tilos!

Bőrre kerülés esetén az oldatot bő vízzel le kell mosni.

Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok)

A túladagolás erős izgatottságot okoz, a méhek lehullását a kaptár aljára vagy akár elhullást is! Intézkedés: a kaptár gyors kiszellőztetése.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

Az állatgyógyászati készítmény nem kerülhet sem szennyvízbe, sem a háztartási hulladékba, mert veszélyes lehet a halakra és más vízi élőlényekre! Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem szükséges állatgyógyászati készítményeket! Ezek az intézkedések a környezetet védik.

14. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA

2022. augusztus 17.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. Kizárólag állatorvosi vényre adható ki.

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon az eseti forgalomba hozatali engedély jogosultjához:

ERISTA KFT.

József Attila u. 5/A

HU-9028 Győr

Tel.: +36 96 423-825, +36 20 4589546

Email: info@erista.hu